

415 MILIOANE ADULȚI CU DIABET
640 MILIOANE PÂNĂ ÎN 2040

MULTE PERSOANE CU DIABET ZAHARAT DE TIP II
NEDIAGNOSTICAT AU DEJA **COMPLICAȚII**:

RETINOPATIE
BOALĂ CARDIOVASCULARĂ
BOALĂ RENALĂ
NEUROPATIE

**SCREENING-UL PENTRU
DIABETUL ZAHARAT DE TIP II
ESTE IMPORTANT** PENTRU
ASIGURAREA UNUI
DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
PRECOCE.

1 DIN 2 ADULȚI CU DIABET **NU ESTE
DIAGNOSTICAT**. CELE MAI MULTE
DINTRE ACESTE CAZURI SUNT DIABET DE
TIP II

SIMPTOMELE DIABETULUI INCLUD:

SETE EXCESIVĂ
SCADERE ÎN GREUTATE
URINARE FRECVENTĂ
LIPSĂ DE ENERGIE
VEDERE ÎNCEȚOȘATĂ

**SCORURILE DE RISC PENTRU
DIABET** SUNT METODE SIMPLE
ȘI COST-EFICIENTE DE
IDENTIFICARE A PEROANELOR
NEDIAGNOSTICATE CU DIABET
ZAHARAT DE TIP II.